AVERTISSEMENTS

AGRICOLES PLP21-2-72277435

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE -

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SÈVRES, VIENNE

12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS - Tél. 1 (49) 41.35.55

ABONNEMENT ANNUEL , 25 F.
C. C. P. LIMOGES 4,752.22 W.
Sous Régisseur de recettes et d'evances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS

ANNEXE au BULLETIN nº 137 - FEVRIER 1972

AVIS AUX ABONNES

RUNCUVELLE ENT DES ABONILEIENTS

Nous remercions les nombreux abonnés qui ont déjà renouvelé leur abonnement 1972 à notre Bulletin Technique. Pour les retardataires, nous signalons que la date limite pour le renouvellement est fixée au 20 février et nous leur serons reconnaissant de renouveler leur abonnement le plus tôt possible.

QUESTIONNAIRES

De nombreux questionnaires nous ont déjà été renveyés. Nous remercions ceux qui nous les ont retourné et demandons aux autres de nous répondre dès que possible pour nous permettre de faire la synthese régionale.

LES TRAITEMENTS D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS

Les traitements d'hiver ont pour but de détruire les mousses, les lichens et surtout les formes hibermantes d'un certain nombre de ravageurs et maladies tels que pucerons, chenilles défoliatrices, cochenilles, acariens, monilia, etc... L'utilité de ces traitements s'impose donc dans la plupart de nos vergers et en particulier dans ceux qui ent reçu une protection insuffisante pendant la période de végétation active.

MESURES PROPHYLACTIQUES

Elles complètent les traitements et consistent à profiter de la merte saison pour nettoyer et assainir les arbres par :

- suppression des rameaux porteurs de chancres ou de nécroses, curetage des autres chancres et badigeonnage de toutes les plaies avec un produit désinfectant.

- élimination et destruction des chicots, des rameeux dépérissants ou dessechés et des fruits

- dans les vergers d'arbres à fruits à pépins, enfouissement des feuilles mortes par un labour.

PRODUITS UTILISABLES

Leur choix sera fonction des ravageurs à combattre.

- Les huiles de goudron ou huiles d'anthracène, détruisent les mousses et les lichens, les cochenilles, les ceufs d'insectes et d'acariens. Elles s'utilisent durant le repos complet de la végétation aux doses de 4 à 5 % pour les arbres à fruits à noyaux et 4 à 8 % pour ceux à pépins.

Les huiles de pétrole ou huiles blanches sont très effiences contre les cochenilles et détruisent également les ocufs d'insectes et d'acariens. Elles s'utilisent à la dose de 3

à 4 litres de produit commercial par hectolitre.

P63 .../...

Imprimerte de la Station Poitou Charentes:-

- Les colorants nitrés sont surtout ovicides (destruction des oeufs d'insectes et d'acariens) et s'utilisent à la dose de 600 g de matière active par hectolitre. Ils doivent être appliqués le plus près possible du débourrement.
 - Les huiles jaunes (2 à 3 litres de produit commercial par hectolitre), les oléoparathions: (1,5 litre de produit commercial par hectolitre), et les oléomalathions (3 litres " " " " "), sont utilisés contre les oeufs d'insectes et d'acariens et contre les cochenilles. Ils peuvent s'employer sans risque pour la végétation jusqu'au stade C.

Quel que soit le produit choisi, la pulvérisation devra être abondante de manière à obtenir un bon "lessivage" des arbres. S'abstenir de traiter en période de gelée, de grand vent ou lorsque les arbres sont mouillés.

PECHER

CLOQUE

Nous rappelons que la méthode efficace pour combattre le champignon est de traiter avec un fongicide les variétés sensibles dès que les bourgeons à bois atteignent le stade B. Certaines variétés ont déjà atteint ce stade. Il correspond à des bourgeons dont les écailles entr'ouvertes laissent apercevoir en regardant par dessus la pointe verte ou rougeâtre de la première feuille. Il est très important de ne pas traiter trop tard.

Produits pouvant être utilisés:

- fongicide à base de cuivre, 500 g. de Cu métal/hl.
- zirame, 175 g/hl.
- thirame; " "

en ly Saari u Accommodit

- ferbame " "
- captane 250 "
- captafol
- association zirame et cuivre, dose recommandée par le fabricant.

ABRICOTIER /

MONILIA

·Date du retour :

Effectuer un traitement similaire à celui recommandé pour la cloque, mais de préférence avec un produit à base de cuivre.

-:-:-:-:-:-:-

l'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la Circonscription Phytosanitaire "Poitou-Charentes" F. BARBOTIN les Ingénieurs chargés des AVERTISSEMENTS AGRICOLES A. GRAVAUD R. HUDE - H. BOUE

Imprimé à la Station, le 15 février 1972 - Précédente note : Bulletin nº 136 - Janvier 1972.-

IMPORTANT /

Nous serions très reconnaissant aux abonnés qui n'ont pas l'intention de renouveller leur abonnement pour 1972 de bien vouloir nous le signaler, en nous faisant retour du coupon 'i-dessous, après l'avoir complété <u>lisiblement</u>.

OM et Prénom , ne désire pas se réabonner pour l'année 19 dresse <u>complète</u> : Département :	à découper suivant	le pointillé et à retor	rner a : SERVICE DE LA I 12, rue Victor	PRŌTĒCTIŌN DĒS VĒGĒTĀUĀ Hugo - POITIERS (86)
	OM et Prenom		, ne désire pas se ré	éabonner pour l'année 197
Département :	iresse <u>complète</u> :	<u> </u>		
			Département :	

(signature)